

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχει παρατηρηθεί πρόσφατα ότι η χορήγηση vedolizumab μπορεί να σχετίζεται με εμφάνιση νέων μυοσκελετικών εκδηλώσεων σε ασθενείς με ΙΦΝΕ (οι οποίοι δεν είχαν ποτε πριν) αλλά και επιδείνωση/ενεργοποίηση μυοσκελετικών εκδηλώσεων σε ασθενείς που είχαν αναλογο ιστορικό αλλά δεν είχαν ενεργό μυοσκελετική νόσο όταν ξεκίνησαν vedolizumab. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν αρθρίτιδα, αρθραλγίες, ενθεσιτιδα, η/και μυαλγίες .

Επειδή έχουν παρατηρηθεί και στον Ελληνικό πληθυσμό παρόμοιες περιπτώσεις η ΕΟΜΙΦΝΕ προσκαλεί τους Έλληνες γαστρεντερολόγους που είναι ενήμεροι για παρόμοιες περιπτώσεις να τις γνωστοποιήσουν στην ΕΟΜΙΦΝΕ ώστε ο πληθυσμός αυτός να αυξηθεί ώστε να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά του και να αξιολογηθεί η κλινική σημασία τους. Μετά την ενημέρωση θα υπάρξει συνεργασία για τον κλινικό έλεγχο απο ρευματολόγο (αν δεν υπάρχει), τον απεικονιστικό έλεγχο (US, MRI), και τον ανοσοφαινοτυπο των ασθενών. Εάν προκύψουν δημοσιεύσιμα συμπεράσματα θα περιληφθούν ως συγγραφείς όλοι οι συμμετέχοντες συνάδελφοι.

PROFILE ασθενών προς καταγραφή

α. ασθενής με ΙΦΝΕ που δεν είχε ποτε μυοσκελετικά προβλήματα και μετα την έναρξη του vedolizumab παρουσιάζει για πρώτη φορά αρθρίτιδα, αρθραλγίες, ενθεσιτιδα, η/και μυαλγίες (de novo population)

β. ασθενής με ΙΦΝΕ που έχει ιστορικό με μυοσκελετικά προβλήματα τα οποία μετα την έναρξη του vedolizumab είτε επιδεινώθηκαν είτε ενεργοποιήθηκαν ενώ ήταν σε ύφεση (reactivation population)

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε προς την ΕΟΜΙΦΝΕ (info@eomifne.gr), είτε απευθείας προς τον Γιώργο Μπάμια (gbamias@gmail.com)