

Τροποποιημένη Ενδοσκοπική διαβάθμιση κατά Rutgeerts (Modified Rutgeerts Score)

(Ενδοσκοπική ταξινόμηση μετεγχειρητικής υποτροπής νόσου Crohn)

	(Ελέγχουμε τα άπω 25 εκατοστά του νεοτελικού ειλεού)
i-0	Απουσία ελκών στον τελικό ειλεό
i-1	≤ 5 αφθώδη έλκη στον τελικό ειλεό
i-2	> 5 αφθώδη έλκη στον τελικό ειλεό με φυσιολογικό βλεννογόνο μεταξύ των βλαβών, ή ασυνεχείς μεγαλύτερες βλάβες ή βλάβες που περιορίζονται στην ειλεοκολική αναστόμωση
i-2a	Βλάβες που περιορίζονται στην ειλεοκολική αναστόμωση (Περιλαμβάνεται και η στένωση της αναστόμωσης)
i-2b	> 5 αφθώδη έλκη ή ασυνεχείς μεγαλύτερες βλάβες, με φυσιολογικό βλεννογόνο μεταξύ αυτών, στον νέο-τελικό ειλεό (με ή χωρίς βλάβες στην αναστόμωση)
i-3	Διάχυτη αφθώδης ειλειτίδα με διάχυτη φλεγμονή του βλεννογόνου
i-4	Μεγάλα έλκη με διάχυτη φλεγμονή του βλεννογόνου ή οζίδια ή στένωση στον νέο-τελικό ειλεό.